

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۲۱۷۰۲۹) - روانشناسی چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۱)

۱- نوسانات خلقی بیماران مبتلاء به اختلالات خلقی معمولاً با کدام دارو درمان می شود؟

۰۱. فلوکستین ۰۲. ایمی پرامین ۰۳. آل دوپا ۰۴. لیتیوم

۲- DSM-IV کدام نوع افسردگی را افسردگی همراه با مالیخولیا می نامد؟

۰۱. افسردگی برون زاد ۰۲. افسردگی درون زاد ۰۳. افسردگی اساسی ۰۴. افسردگی مضاعف

۳- مهمترین ناحیه مغزی دخیل در افسردگی کدام ناحیه است؟

۰۱. لیمبیک ۰۲. تالاموس ۰۳. قشر مغز ۰۴. هیپوکامپ

۴- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۰۱. ابرامسون ۰۲. سلیگمن ۰۳. بک ۰۴. آبل و همکاران

۵- کدام یک از داروهای زیر جزء سه حلقوی ها نمی باشد؟

۰۱. فلوکستین ۰۲. آمی تریپتیلین ۰۳. دسی پرامین ۰۴. ایمی پرامین

۶- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۰۱. یأس و ناامیدی ۰۲. هذیان و توهم ۰۳. داروهای مصرفی ۰۴. ناآرامی درونی

۷- تبیین های سبب شناسی اختلال عاطفی فصلی عمدتاً بر چه اساسی قرار گرفته اند؟

۰۱. روان شناختی ۰۲. زیست شناختی ۰۳. شناختی ۰۴. روان تحلیل گری

۸- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۰۱. حساسیت کم ۰۲. تحریک پذیری ۰۳. کم فعالی ۰۴. ناامیدی

۹- افراد مبتلا به اختلال ادواری خویی شدیداً در معرض خطر ابتلا به کدام اختلال قرار دارند؟

۰۱. اختلال SAD ۰۲. اختلال دوقطبی

۰۳. اختلال افسردگی خویی ۰۴. افسردگی اساسی

۱۰- شدیدترین اختلال روانی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۰۱. افسردگی ۰۲. اختلال دوقطبی

۰۳. اسکیزوفرنی ۰۴. اختلال شخصیت پارانوئید

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی چندبخشی) (۱۲۱۷۰۶۱)

۱۱- شایع ترین نشانه اسکیزوفرنی حاد مربوط به کدام نشانه است؟

۰۱ فقدان بینش ۰۲ اختلالات گفتاری ۰۳ توهمات دیداری ۰۴ عاطفه بی حالت

۱۲- بر اساس ملاک های تشخیص DSM-IV-TR نشانه های اسکیزوفرنیا در چه مدت قابل تشخیص می باشد؟

۰۱ ۶ هفته ۰۲ ۱ ماه ۰۳ ۳ ماه ۰۴ ۲ هفته

۱۳- کدامیک از نروترانسmitterهای زیر در اسکیزوفرنیا نقش عمده ای دارد؟

۰۱ سروتونین ۰۲ استیل کولین ۰۳ اپی نفرین ۰۴ دوپامین

۱۴- مصرف کدام یک از مواد زیر خطر ابتلاء به اسکیزوفرنی را افزایش می دهد؟

۰۱ آمفتامین ۰۲ هروئین ۰۳ حشیش ۰۴ کوکائین

۱۵- کدام درمان زیر امروزه برای درمان اسکیزوفرنی کاربرد ندارد؟

۰۱ کلرپرمازین ۰۲ الکترو شوک درمانی ۰۳ کلوزاپین ۰۴ هالوپریدول

۱۶- کدام یک از موارد زیر، در اسکیزوفرنیا دارو درمانی را بهبود می بخشد؟

۰۱ مدیریت استرس ۰۲ تغییر باورها ۰۳ خانواده درمانی ۰۴ چالش کلامی

۱۷- شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می گیرد؟

۰۱ ۲۰-۲۸ سالگی ۰۲ ۲۰-۳۹ سالگی ۰۳ ۲۰-۳۶ سالگی ۰۴ ۱۸-۳۹ سالگی

۱۸- کدام اختلال های شخصیتی در مردان بیشتر است؟

۰۱ ضداجتماعی و خودشیفته ۰۲ نمایشی و مرزی
۰۳ ضداجتماعی و مرزی ۰۴ نمایشی و خودشیفته

۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۰۱ احساس خالی بودن ۰۲ فرار از روابط نزدیک ۰۳ آشفتگی هویت ۰۴ خودآسیب زنی عمدی

۲۰- بک و همکاران در تبیین شان از اختلالات شخصیت چه نظرگاهی اتخاذ کرده اند؟

۰۱ روان تحلیل گری ۰۲ زیستی ۰۳ ژنتیکی ۰۴ تکاملی

۲۱- نام قدیم شخصیت نمایشی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۰۱ نارسیسم ۰۲ اسکیزوفرنی ۰۳ سایکوپات ۰۴ هیستریک

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۲۲- در کدام یک از اختلالات زیر تفکر خودکشی و تلاش هایی برای خودکشی رایج است؟

- ۰۱ اختلال پارانویایی
۰۲ اختلال شخصیت مرزی
۰۳ اختلال ضداجتماعی
۰۴ خودشیفته

۲۳- کدام یک از اختلال های شخصیتی زیر با خصوصیات شخصیتی تیپ A مطابقت می کند؟

- ۰۱ وسواسی- جبری
۰۲ وابسته
۰۳ دوری گزین
۰۴ منفعل- پرخاشگر

۲۴- بر اساس نظام DSM-IV سن تشخیص اختلالات شخصیت چه سنی است؟

- ۰۱ ۱۴ سالگی
۰۲ ۱۸ سالگی
۰۳ ۲۲ سالگی
۰۴ ۲۵ سالگی

۲۵- بر اساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟

- ۰۱ روان رنجور خویی بالا
۰۲ برون گرایی پایین
۰۳ کمال گرایی
۰۴ علاقه به تنهایی

۲۶- اصطلاح بی اشتهایی روانی توسط چه کسی و در چه سالی وارد قلمرو پزشکی شد؟

- ۰۱ مورتن ۱۶۹۴
۰۲ گول ۱۸۷۴
۰۳ فروید ۱۹۰۰
۰۴ کراپلین ۱۸۲۴

۲۷- در بین مبتلایان به بی اشتهایی پرخوری - پاکسازی کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟

- ۰۱ سوءمصرف مواد
۰۲ اختلال کمبود توجه
۰۳ تمارض
۰۴ اختلال دوقطبی

۲۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

- ۰۱ تالاموس
۰۲ هیپوتالاموس
۰۳ هیپوکامپ
۰۴ هیپوفیز

۲۹- چند درصد از واریانس رفتارهای بی اشتهایی را می توان به عوامل ژنتیکی نسبت داد؟

- ۰۱ ۴۵٪
۰۲ ۵۵٪
۰۳ ۶۵٪
۰۴ ۷۵٪

۳۰- کدامیک از دارو های زیر برای هر دو اختلال های تغذیه ای سودمند است؟

- ۰۱ داروهای ضدافسردگی
۰۲ داروهای ضدجنون
۰۳ داروهای ضداضطراب
۰۴ داروهای ضداستفراغ

۳۱- طبق برخی نظریه ها کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

- ۰۱ REM
۰۲ مرحله دوم
۰۳ مرحله سوم
۰۴ مرحله چهارم

۳۲- کابوس در کدام مرحله خواب روی می دهد؟

- ۰۱ non-REM
۰۲ REM
۰۳ مرحله اول
۰۴ مرحله دوم

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۳۳- اصلی ترین ملاک تشخیص ناکولوپسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. بیخوابی غیرقابل کنترل در شب
۲. تجربه کاتاپلکسی (خشک زدگی)
۳. حملات غیرقابل کنترل خواب در طول روز
۴. توهمات هیناگوژیک

۳۴- کدام اختلال نشانگر فعال شدن دستگاه های فیزیولوژیایی در حین خواب است؟

۱. اختلال پر خوابی
۲. دیس سومینا
۳. اختلال اولیه خواب
۴. پاراسومیناها

۳۵- مرحله اول جراحی اختلال هویت جنسی شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. تزریق هورمون جنس مقابل
۲. روان درمان متمرکز به تغییر
۳. تزریق تسترون
۴. پروژسترون

۳۶- در سبب شناسی روان تحلیلی یادگار خواهی جنسی همراه با مبدل پوشی، کدام مکانیسم دفاعی قابل مشاهده است؟

۱. جابجایی
۲. واکنش وارونه
۳. برگشت
۴. فرافکنی

۳۷- رایج ترین نوع دمانس، در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟

۱. صرع
۲. آلزایمر
۳. پارکینسون
۴. MS

۳۸- رایجترین یافته در مغز بیماران صرعی چیست؟

۱. تجمع دوطرفه نرون های CA لایه پیرامیدال هیپوکامپ
۲. فقدان دو طرفه نرون های CA لایه پیرامیدال هیپوکامپ
۳. فقدان دو طرفه نرون های نیمکره های مغزی
۴. تجمع دوطرفه نرون های نیمکره های مغزی

۳۹- بیماری پارکینسون معمولاً در بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۴۰-۷۰ سالگی
۲. ۳۰-۶۰ سالگی
۳. ۵۰-۸۰ سالگی
۴. ۶۰-۹۰ سالگی

۴۰- صدمات سری که در آن مجسمه یا بافت مغزی فرد آسیب می بیند چه نامیده می شود؟

۱. صدمات بسته
۲. ضربات مغزی بسته
۳. آسیب مغزی
۴. صدمات باز