

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: صنایع تخمیری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۱۴

۱- رضایت بخش ترین روش برای نگهداری طولانی مدت میکروارگانیسمها کدام است؟

- ۱. نگهداری در ازت مایع
- ۲. نگهداری در روغنهاي معدني
- ۳. نگهداری بر روی محیط کشت شب دار
- ۴. لیوفیلیزه کردن

۲- از نقطه نظر صنعتی، مخمری که به عنوان مخمر کشت داده شده در یک صنعت مد نظر است؛ در صنعت دیگر به عنوان ..... تلقی می شود.

- ۱. مخمر حقيقی
- ۲. مخمر وحشی
- ۳. مخمر سطحی
- ۴. مخمر کشت داده شده

۳- اگر در محیط کشت دارای گلوکز، غلظت گلوکز بیش از ۵٪ باشد؛ چه تأثیری بر متابولیسم ساکارومایسیس سرویزیه خواهد داشت؟

- ۱. اگر محیط هوادهی شود، شرایط تخمیر به تنفس تبدیل می شود.
- ۲. سنتر آنزیمهای تنفسی تشید می گردد.
- ۳. این مخمر تأثیر گلوکز را نشان نمی دهد.
- ۴. حتی اگر محیط هوادهی شود، مخمر به عمل تخمیر ادامه می دهد.

۴- کدامیک از کربوهیدراتهای زیر توسط مخمر نانوایی قابل تخمیر می باشد؟

- ۱. پنتوزها
- ۲. لاکتوز
- ۳. ال-مانوز
- ۴. د-گلوکز

۵- مخمر نانوایی توانایی رشد بر روی کدامیک از منابع نیتروژن را ندارد؟

- ۱. نمکهای آمونیوم سولفات
- ۲. نیترات
- ۳. اوره
- ۴. گلوتامیک اسید

۶- معمولترین ویتامین مورد نیاز مخمرها که باید به محیط کشت آنها اضافه شود کدام است؟

- ۱. ویتامین  $B_{12}$
- ۲. ریبوفلاوین
- ۳. بیوتین
- ۴. اسید فولیک

۷- هدف از بکارگیری سیلیکون یا دیگر مواد فعال سطحی خوراکی در فرمانتورها چیست؟

- ۱. جلوگیری از ایجاد کف در تخمیرهایی که هوادهی بالا دارند.
- ۲. به عنوان منبع نیتروژن غیرآلی بکار می روند.
- ۳. منبع فرعی کربن و انرژی برای تولید مخمر می باشد.
- ۴. باعث کاهش آلودگی و عفونت در فرمانتور می گردند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: صنایع تخمیری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۱۴

۸- به منظور حفاظت از مخمر خشک فعال شده با رطوبت پایین در مقابل اکسیداتیو کدام روش توصیه می شود؟

۱. افزودن ویتامین E به داخل بسته بندی

۲. بسته بندی در یک اتمسفر با اکسیژن کمتر از ۵٪

۳. اضافه کردن BHA به مخمر خشک و بسته بندی در قوطی های حلبی

۴. موارد ۱ و ۲ صحیح اند.

۹- کدام گزینه به عنوان فاکتور اساسی برای رشد باکتریهای اسید گلوتامیک مطرح می باشد؟

۴. اوره

۳. سیستئین

۲. تیامین

۱. بیوتین

۱۰- کدام منبع برای تولید آنزیمهای صنعتی مطلوبتر است؟

۴. هیچکدام

۳. میکروارگانیسمها

۲. حیوانات

۱. گیاهان

۱۱- اولین قدم در تولید آنزیمهای به روش صنعتی کدام است؟

۲. استریل کردن محیط کشت

۱. انتخاب محیط کشت مناسب

۴. انتخاب زمان توقف تخمیر

۳. انتخاب نوع میکروارگانیسم

۱۲- کدام گزینه به عنوان محرک برای بیوسنتز آمیلاز توسط میکروارگانیسمها مطرح می باشد؟

۲. پروتئین

۱. چربی

۴. اسیدهای آمینه سولفوردار

۳. نشاسته

۱۳- به منظور مقاوم کردن آنزیمهای کاتابولیتی کدام گزینه مؤثر می باشد؟

۲. استفاده از تکنیک کشت مایع

۱. افزایش غلظت سوبسترا

۴. تجمع محصولات نهایی در محیط کشت

۳. دستکاری ژنتیکی

۱۴- به منظور تولید آنزیمهای تجاری از منابع قارچی کدامیک از تکنیکهای کشت توصیه می گردد؟

۴. کشت توسعه یافته

۳. کشت غوطه وری

۲. کشت مایع

۱. کشت جامد

۱۵- آنزیمهای تولید شده از کدام محیط کشت بیشتر از نوع خارج سلولی هستند؟

۴. کشت غوطه وری

۳. کشت توسعه یافته

۲. کشت جامد

۱. کشت مایع

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: صنایع تخمیری

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۱۴

**۱۶- مهمترین عامل محدود کننده استفاده از آنزیمهای درون سلولی در تولید صنعتی آنزیمهها کدام است؟**

۱. پائین بودن فعالیت آنزیمی
۲. لزوم سترون سازی یا استریل کردن محیط کشت
۳. مشکل بودن انتخاب زمان توقف تخمیر
۴. استخراج و خالص سازی این نوع آنزیمهها نیازمند متلاشی نمودن سلول میکروارگانیسم می باشد.

**۱۷- به ترتیب جداسازی آنزیمهای درون سلولی چگونه صورت می گیرد؟**

۱. جداسازی آنزیم از محیط کشت جامد با روش فیلتراسیون، هموژنیزاسیون سوسپانسیون سلولی
۲. جداسازی آنزیم از محیط کشت مایع با سانتریفیوژ کردن، ترسیب مایع روی محلول سانتریفیوژ شده
۳. هموژنیزاسیون محیط کشت مایع، ترسیب سلولهای میکروبی با استون، تخریب دیواره سلولی، ترسیب آنزیم با استون
۴. جداسازی سلول میکروبی از محیط کشت، تخریب دیواره سلولی، ترسیب آنزیم با سولفات آمونیوم، جداسازی رسوب با سانتریفیوژ

**۱۸- تولید صنعتی کدام آنزیم با رشد مخمر بر روی محیط کشت آب پنیری صورت می گیرد؟**

۱. پولولاناز
۲. بتاگالاكتوزیداز
۳. انورتاز
۴. پکتیناز

**۱۹- حداقل تولید آنزیم در کدامیک از مراحل رشد مخمر صورت می گیرد؟**

۱. فاز تأخیر
۲. فاز سکون
۳. ابتدای فاز لگاریتمی رشد
۴. انتهای فاز لگاریتمی رشد

**۲۰- منظور از مش (Mash) در تولید صنعتی سرکه چیست؟**

۱. کف زدا که از سر رفتن محتويات فرمانتور جلوگیری می کند.
۲. سرکه ای که از تخمیر الکلی و سپس اسیدی محلول حاوی گلوکز تهیه می شود.
۳. محلول حاوی الکل، آب و مواد غذایی که به عنوان محیط کشت برای باکتریهای اسید استیک بکار می رود.
۴. سرکه ای که از آب پنیر بدست می آید.

**۲۱- منظور از سرکه سیدر (Cider) کدام است؟**

۱. سرکه حاصل از شراب انگور
۲. سرکه حاصل از شراب سیب
۳. سرکه برنج
۴. سرکه گلوکز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: صنایع تخمیری

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۱۴

**۲۲- کدامیک از باکتریهای زیر اتانول را فقط به اسید استیک اکسید می کنند و Overoxidizer نیستند؟**

۱. استوباکتر استی  
۲. استوباکتر پاستریانس  
۳. استوباکتر پراکسیدانس  
۴. گلوکونوباکترها

**۲۳- برای اندازه گیری الکل و کنترل فرآیند تخمیر از کدام گزینه استفاده می گردد؟**

۱. استاتاتور  
۲. کاویتانور  
۳. روتور  
۴. الکوگراف

**۲۴- کدام گزینه در ارتباط با تولید اسید سیتریک نادرست می باشد؟**

۱. عمدۀ ترین منبع کربن مورد استفاده برای تولید اسید سیتریک گلوکز است.  
۲. پیروات دکربوکسیلاز آنزیم کلیدی تولید اسید سیتریک می باشد.  
۳. پنتوزها می توانند برای تولید اسید سیتریک مورد استفاده قرار گیرند.  
۴. اکتیویته سیترات سنتتاز در هنگام تولید اسید سیتریک کاهش می یابد.

**۲۵- مشکلی که در رابطه با تولید اسید سیتریک توسط مخمرها وجود دارد کدام است؟**

۱. تولید همزمان اسید ایزوسیتریک  
۲. پتانسیل پایین برای توسعه فرآیند پیوسته تولید اسید سیتریک  
۳. نیازهای غذایی بیشتر مخمرها  
۴. افزایش pH محیط کشت توسط متابولیتهای مخمرها و در نتیجه کاهش تولید اسید سیتریک

**۲۶- تخمیر لاكتیکی کلم ترش توسط کدام میکرووارگانیسم آغاز می شود؟**

۱. لاکتوباسیلوس برویس  
۲. لاکتوباسیلوس پلاتاروم  
۳. کوکسی ها  
۴. لوکونوستوک مزنتروئیدوس

**۲۷- در تولید کلم ترش تخمیری کدام گزینه یک مرحله طبیعی در تولید محسوب شده و به عنوان نقص تلقی نمی گردد؟**

۱. صورتی شدن کلم در نتیجه رشد مخمرهای اسپوروزن  
۲. لزجی و نرم شدن کلم ناشی از فعالیت پکتولیتیک کپکها  
۳. لزجی و نرم شدن کلم ناشی از فعالیت پکتولیتیک مخمرها  
۴. لزجی کلم ناشی از تولید دکستران های لزج توسط لوکونوستوک مزنتروئیدوس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: صنایع تخمیری

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۱۴

۲۸- فساد نرم شدگی ترشیجات توسط کدام دسته از میکرووارگانیسمها ایجاد می گردد؟

- ۱. تمامی میکروارگانیسمهای مولد گاز
- ۲. پدیوکوکوس سرویزیه
- ۳. لاکتوباسیلوس پلاتارتوم
- ۴. میکرووارگانیسمهای پکتولیتیک

۲۹- در زیتون سبز تخمیری عامل فساد زاپاترا کدام گزینه می باشد؟

- ۱. کلی فرم ها
- ۲. کلستریدیوم و پروپیونی باکتریوم
- ۳. لاکتوباسیلوس برویس
- ۴. میکروکوکوس

۳۰- فعالترین باکتری سلولیتیک کدام است؟

- ۱. گزانتموناس
- ۲. آئروباکتر
- ۳. اشرشیا
- ۴. سلولوموناس فلامویژنا

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ب	عادی
3	د	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	الف	عادی
8	ج	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	ج	عادی
12	ج	عادی
13	ج	عادی
14	الف	عادی
15	ب	عادی
16	د	عادی
17	د	عادی
18	ب	عادی
19	د	عادی
20	ج	عادی
21	ب	عادی
22	د	عادی
23	د	عادی
24	د	عادی
25	الف	عادی
26	د	عادی
27	د	عادی
28	د	عادی
29	ب	عادی
30	د	عادی