

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱- افسردگی بهنجار چه تفاوتی با افسردگی یک قطبی دارد؟

- ۰.۱ نشانه های بهنجار کمتر ولی طولانی تر است.
- ۰.۲ نشانه های بهنجار شدیدترند.
- ۰.۳ نشانه های یک قطبی شدیدتر و فراوان ترند.
- ۰.۴ نشانه های یک قطبی خفیف تر ولی طولانی ترند.

۲- نشانه های شناختی افسردگی از دیدگاه بک (Beck) چه موردی را شامل نمی شود؟

- ۰.۱ نظر منفی نسبت به خود
- ۰.۲ نظر منفی نسبت به دیگران
- ۰.۳ نظر منفی نسبت به آینده
- ۰.۴ نظر منفی نسبت به گذشته

۳- افراد مبتلا به اختلال افسرده خویی دست کم به چه مدتی به برخی از نشانه های افسردگی اساسی مبتلا می شوند؟

- ۰.۱ ۲ سال
- ۰.۲ ۲ ماه
- ۰.۳ ۲ روز
- ۰.۴ ۲ هفته

۴- چنانچه یک فرد مبتلا به افسردگی، در تمرکز به یک امر جزئی بی اهمیت منفی در عین حال به نادیده گرفتن ویژگی های مثبت مهم تر اقدام نماید، کدام یک از پنج خطای منطقی را انجام داده است؟

- ۰.۱ تعمیم مفرط
- ۰.۲ شخصی سازی
- ۰.۳ انتزاع گزینشی
- ۰.۴ استنباط دلخواهی

۵- کدام دسته از روانشناسان اعتقاد دارند که مانیا یک مکانیسم دفاعی افراطی در مواجهه با حالات هیجانی ناخوشایند یا تکانه های نامقبول می باشد؟

- ۰.۱ رفتارگرایان
- ۰.۲ شناخت گرایان
- ۰.۳ زیست شناخت گران
- ۰.۴ روان تحلیلیگران

۶- این اختلال حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد نشانه های افسردگی اساسی را به طور خفیف و هیپومانیا را به صورت دوره ای تجربه می نماید؟

- ۰.۱ دو قطبی نوع I
- ۰.۲ ادواری خویی
- ۰.۳ دو قطبی نوع II
- ۰.۴ افسردگی فصلی

۷- از دیدگاه این دانشمند چهار نشانه اصلی اسکیزوفرنی عبارتند از: دوسوگرایی، آشفتگی تداعی ها، آشفتگی خلق و خیال پردازی؟

- ۰.۱ بلولر
- ۰.۲ کراپلین
- ۰.۳ فروید
- ۰.۴ بک

۸- نشانه های مثبت اسکیزوفرنی عبارتند از:

- ۰.۱ هذیان - توهم
- ۰.۲ فقدان تکلم - نقص توجه
- ۰.۳ گفتار حاشیه ای - فقدان لذت
- ۰.۴ خلق بی حالت - بی ارادگی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۹- در این نوع از اسکیزوفرنی تهییج افراطی، بهت و انعطاف مومی شکل دیده می شود؟

- ۰۱ هبفرنیا ۰۲ پارانوئید ۰۳ کاتاتونیک ۰۴ باقی مانده

۱۰- شایعترین نشانه ی اسکیزوفرنی حاد که این بیماری را از بسیاری دیگر از اختلالات متمایز می کند چیست ؟

- ۰۱ گفتار آشفته ۰۲ شروع ناگهانی و بهبودی زیاد
۰۳ تفکرات آشفته ۰۴ شروع آرام و پیش آگهی بد

۱۱- طبق نظر فارل و شاو افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در چه زمینه ای مشکل دارند ؟

- ۰۱ در تفکر ۰۲ در حافظه
۰۳ در مهارت های فرا شناختی ۰۴ ناتوانی در فهم و توصیف حالت های هیجانی

۱۲- مشخصه های بالینی خاصی که با پیش آگاهی ضعیف برای تشخیص اسکیزوفرنی به کار می رود عبارتند از؟

- ۰۱ طبقه اجتماعی بالا- جنسیت مونث - وجود مولفه برجسته
۰۲ شروع دیررس- جنسیت مونث - نشانه های مثبت
۰۳ طبقه اجتماعی متوسط - IQ بالا - جنسیت مذکر
۰۴ شروع زودرس - جنسیت مذکر - نشانه های منفی

۱۳- براساس این مدل روانشناختی مبتلایان به اسکیزوفرنیا در مواجهه با استرس های زندگی از راهبردهای مقابله ای ضعیف تری استفاده می کنند؟

- ۰۱ مدل ضربه ای روانی و توهمات ۰۲ مدل شناختی هذیان ها
۰۳ مدل مقابله ای ۰۴ مدل زیست روانشناختی

۱۴- براساس مهمترین یافته های عکس برداری از مغز کاهش حجم کرتکس در کدام نواحی با اسکیزوفرنی ارتباط بیشتری دارد؟

- ۰۱ لوب پیشانی - پس سری ۰۲ لوب گیجگاهی - پیشانی
۰۳ لوب پیشانی - آهیانه ای ۰۴ لوب گیجگاهی - آهیانه ای

۱۵- افراد مبتلا به اختلال شخصیت، حداقل در چند مورد از انتظارات فرهنگی دچار انحراف هستند؟

- ۰۱ یک مورد ۰۲ دو مورد ۰۳ سه مورد ۰۴ چهار مورد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۶- اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرند؟

۰۱. دسته سوم - عجیب و غریب
۰۲. دسته دوم - هیجانی
۰۳. دسته سوم - مضطرب
۰۴. دسته دوم - ترسو

۱۷- براساس مدل شناختی بک این باور که من اساساً یک فرد تنها هستم و زمانیکه تنها هستم دارای کارایی بیشتر هستم ، مربوط به کدام نوع از اختلالات شخصیت می باشد؟

۰۱. شخصیت ضد اجتماعی
۰۲. شخصیت نمایشی
۰۳. شخصیت اسکیزوئید
۰۴. شخصیت وابسته

۱۸- مکانیسم دفاعی اصلی در شخصیت های نمایشی چیست ؟

۰۱. واپس زدن و تجزیه
۰۲. انکار
۰۳. والایش
۰۴. پالایش

۱۹- از نظر سبب شناسی چه عاملی شخصیت سایکوپات را از شخصیت ضداجتماعی متمایز می کند؟

۰۱. افکار دوگانه
۰۲. هیجانان ضعیف و مشکلات خستگی
۰۳. گسلس هیجانی - عمق محدود هیجانان
۰۴. شکایت های جسمانی و مکانیسم های دفاعی

۲۰- درنظام طبقه بندی ICD-10، از کدام اختلال شخصیت به عنوان اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات نام برده می شود؟

۰۱. اسکیزوتایپال
۰۲. ضداجتماعی
۰۳. نمایشی
۰۴. مرزی

۲۱- هدف اولیه درمان برای افراد دارای اختلال شخصیت زیر ۳۰ سال چیست ؟

۰۱. کنترل هیجانان
۰۲. مدیریت رفتار
۰۳. پیشگیری از خودکشی
۰۴. ایجاد حمایت اجتماعی

۲۲- سطوح بالای تکانشی بودن ، تحریک پذیری ، پرخاشگری و در جستجوی هیجان بودن در اختلال شخصیت ضد اجتماعی با کدام انتقال دهنده عصبی رابطه دارد؟

۰۱. سرونونین
۰۲. آدرنالین
۰۳. دوپامین
۰۴. نورآدرنالین

۲۳- در کدام نوع از اختلال بی اشتهائی روانی ، اختلال شخصیت و کنترل تکانه مشاهده می شود؟

۰۱. محدودکننده
۰۲. پرخوری - پاکسازی
۰۳. پرخوری محدود کننده
۰۴. محدودکننده - پاکسازی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۲۴- مهم ترین پیامد رفتارهای جبرانی در اختلال پراشتهایی روانی چیست؟

۰۱. مشکلات گوارشی ۰۲. عدم تعادل الکترولیت

۰۳. دردهای شکمی ۰۴. آسیب دندان ها

۲۵- از نظر روان تحلیل گران علت بی اشتتهایی روانی در نوجوانان در کدام گزینه ذکر نشده است؟

۰۱. کسب استقلال بیشتر ۰۲. افزایش عملکرد اجتماعی

۰۳. افزایش عملکرد جنسی ۰۴. اختلال شناختی

۲۶- براساس مطالعات ۲۱ درصد مرگ بیماران مبتلا به بی اشتتهایی روانی بر اثر چیست؟

۰۱. فشارخون پایین - آمنوریا ۰۲. غلظت پایین مواد معدنی

۰۳. گرسنگی - خودکشی ۰۴. ترک برداشتن پوست - آمنوریا

۲۷- توهم های هیپناگوزیک و هیپنوپامییک در کدامیک از نوع اختلال خواب شایع است؟

۰۱. پر خوابی اولیه ۰۲. نارکولپسی ۰۳. کابوس ۰۴. بی خوابی اولیه

۲۸- به اختلالی که در آن فرد در ثلث اول شب در حالت خواب عمیق باشد و ناگهان از خواب بیدار شود و با تجربه ترس، داد و فریاد یا گریه همراه است، چه می گویند؟

۰۱. اختلال کابوس ۰۲. خواب گردی ۰۳. آپنه ۰۴. وحشت شبانه

۲۹- کمبود انتقال دهنده عصبی هیپوکرتین در ابتلا به کدام اختلال خواب موثر است؟

۰۱. خوابگردی ۰۲. نارکولپسی ۰۳. کابوس ۰۴. وحشت شبانه

۳۰- مدت زمان لازم برای تشخیص بی خوابی اولیه چقدر می باشد؟

۰۱. ۱ هفته ۰۲. ۱۰ روز ۰۳. ۱۰ ماه ۰۴. ۱ ماه

۳۱- اختلال نعوظی در کدام طبقه بندی سنی بیشتر شیوع دارد؟

۰۱. ۱۸-۲۹ ۰۲. ۵۰-۵۹ ۰۳. ۴۰-۴۹ ۰۴. ۳۰-۳۹

۳۲- براساس پارادیم روان تحلیل گری، اگر مادر صمیمی و حمایت گر و پدر سرد و تهدیدکننده باشد، احتمالاً فرزند مذکر دچار چه اختلالی خواهد شد؟

۰۱. یادگارخواهی جنسی ۰۲. مبدل پوشی ۰۳. پارافیلی NOS ۰۴. اختلال ارگاسمی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

۱. روان تحلیل گری
۲. شناختی
۳. زیستی
۴. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی

۳۴- بر اساس DSM-IV اختلال در کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به آلزایمر شامل کدام مورد می شود؟

۱. فقدان حافظه و ناتوانی تشخیصی
۲. مشکل در برنامه ریزی، انتزاع و سازماندهی
۳. آشفتگی زبانی
۴. آسیب در انجام اعمال هدفمند

۳۵- کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر با بیماری آلزایمر رابطه ندارد؟

۱. دوپامین
۲. استیل کولین
۳. نورآدرنالین
۴. سروتونین

۳۶- تمایلات، رفتارها و تخیلات جنسی شدید و تکراری در واکنش به موقعیات ناپسند جامعه چه نامیده می شوند؟

۱. دیس سومنیاها
۲. پارافیلیاها
۳. آگنوزیاها
۴. دمانس جنسی

۳۷- وجود کدام اختلال در بیماران مبتلا به MS موجب پیشرفت سریع بیماری، ناتوانی شدید و مرگ می شود؟

۱. استرس
۲. خستگی
۳. افسردگی
۴. خودکشی

۳۸- فقدان سلول های رنگدانه ای در جسم سیاه و هسته های رنگی دیگر مغز منجر به شکل گیری چه اختلالی می شود؟

۱. صرع
۲. پارکینسون
۳. MS
۴. آلزایمر

۳۹- در بیماری صرع، حالات روان شناختی خشم و پارانوئیا به کدام مورد زیر مربوط می شود؟

۱. لوب گیجگاهی راست
۲. لوب آهیانه ای
۳. لوب گیجگاهی چپ
۴. لوب پس سری

۴۰- مهارت IDEAL که توسط برانسفورد و استاین ارائه گردید، به چه موضوعی مربوط است؟

۱. حل مساله
۲. مشکلات حافظه
۳. تصمیم گیری
۴. درمان افسردگی