

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: مقدمات روانپزشکی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۱- در کدام مدل رفتاری بین پزشک و بیمار چنین فرض می شود که پزشک آن چه را بهتر است می داند و تجویز می کند؟

۱. مدل مشورتی ۲. مدل آموزنده ۳. مدل تعبیری ۴. مدل پدر مآبانه

۲- کدام گزینه در زمینه مصاحبه نادرست بیان شده است؟

۱. عوامل تکنیکی مثل قطع مصاحبه به دلیل تلفن، بر مصاحبه اثر دارد.
۲. مصاحبه ماهرانه درک بیماران را افزایش می دهد.
۳. پزشکان از طریق مصاحبه معمولی می توانند داده های لازم را برای درک و درمان بیمار به دست آورند.
۴. سبک گرایش و تجربه مصاحبه کننده در مصاحبه موثر است.

۳- به عقیده کارشناسان مصاحبه ایده آل چگونه مصاحبه ای است؟

۱. با پرسش های گسترده باز پاسخ شروع، با اختصاصی شدن ادامه و با پرسش مستقیم مفصل خاتمه یابد.
۲. بدون تکلم شروع و به بیان احساسات و واکنش ها برسد.
۳. با سوالات بسته پاسخ و آری و خیر شروع و به سوالات اختصاصی خاتمه یابد.
۴. بیمار به درکی از بیماری و علت حضور وی در نزد پزشک برسد.

۴- مهمترین عامل در مساله رعایت توصیه های درمانی کدام است؟

۱. تخصص پزشک ۲. رابطه پزشک - بیمار ۳. شدت بیماری مراجع ۴. زمان مراجعه بعدی

۵- دادن سرنخ های کلامی، تکان دادن سر و جلو کشیدن صندلی جز کدام یک از روش های خاص مصاحبه است؟

۱. بازتابش ۲. سکوت همدلانه ۳. تصریح ۴. هموارسازی

۶- برخوردی توأم با احترام اما رسمی و فاقد صمیمیت و شرح مفصل تصمیمات درمانی از راهبردهای مشاوره با کدام بیماران است؟

۱. بیماران پرتوقع ۲. بیماران منزوی ۳. بیماران شکاک ۴. بیماران خودشیفته

۷- کدام گزینه معیاری برای توانایی عملکرد فعلی است و لزوماً آینده را مشخص نمی کند؟

۱. مهارتهای کلامی ۲. آزمون فرافکن ۳. هنجاریابی ۴. بهره هوشی

۸- چه آزمونی برای ارتباط دادن تداعی های آگاهانه بیمار به زمینه هایی که روان شناس علاقه مند به بررسی آنها است به کار می رود؟

۱. آزمون اندریافت ۲. آزمون تداعی واژه ها ۳. آزمون تکمیل جمله ۴. آزمون نقاشی شکل آدم

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپزشکی

سری سوال: ۱ یک

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۹- کدام گزینه مشکل ترین وجه ارزیابی روان شناسی است؟

۱. ادغام یافته های آزمون به صورت گزارش جامع
۲. ارتباط دادن تداعی های آگاهانه بیمار به زمینه های مورد علاقه روانشناس
۳. مطالعه شخصیت ساخته و پرداخته مراجع از خود
۴. بررسی دلایل دو پهلو بودن محرکهای واکنشی مراجع

۱۰- کدام آزمون به فقدان حافظه کوتاه مدت حساس است؟

۱. آزمون حافظه وکسلر
۲. آزمون دسته بندی برگه های ویسکانسین
۳. آزمون حافظه دیداری بنتون
۴. آزمون بندرگشتالت

۱۱- کدام آزمون بیش از همه به عنوان یک وسیله پالایشی در تشخیص اختلالات عضوی بزرگسالان به کار برده می شود؟

۱. آزمون پلایش آفازی
۲. آزمون بندر- گشتالت
۳. آزمون لوریا نبرسکا
۴. آزمون ویسکانسین

۱۲- در کدام قسمت معاینه روانی عین کلمات بیمار، دلیل مراجعه یا آورده شدن او برای مساعدت حرفه ای ثبت می شود؟

۱. داده های شناساننده
۲. شکایت عمده
۳. سابقه خانوادگی
۴. شرح حال روان پزشکی بیمار

۱۳- کدام نوع حافظه را می توان با پرسش درمورد اشتباهای بیمار و بعد از صرف غذا امتحان کرد؟

۱. حافظه نزدیک
۲. حافظه گذشته نزدیک
۳. حافظه نگهداری و یادآوری
۴. حافظه دور

۱۴- بررسی همانند سازی جنسی، وجود کابوس، شب ادراری و استمنا در کدام دوره سابقه شخصی بیمار قابل توجه است؟

۱. اوایل کودکی
۲. اواخر کودکی
۳. اواسط کودکی
۴. بلوغ

۱۵- کدام نوع توهم به هنگام خواب رفتن تجربه می شود؟

۱. ایلوزیون
۲. هیپنوپامپیک
۳. مسخ
۴. هیپناگوزیک

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: مقدمات روانپزشکی

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۱۶- مفهوم خنثی بودن در روانپزشکی تحلیلی به چه معنا است؟

۱. روانپزشک در تعارض های درون روانی بیمار جهت گیری نمی کند.
۲. روانپزشک در رابطه با بیمار بدون واکنش است.
۳. روانپزشک عین واقعیت را در هر شرایطی به بیمار منعکس کند.
۴. روانپزشک بدون توجه به طبقه اجتماعی بیمار با او برخورد کند.

۱۷- تجویز وریدی کدام دارو باعث برانگیختن حملات هراس می شود؟

۱. لاکتات سدیم
۲. تاکرین
۳. والپروئیت
۴. لیتیوم

۱۸- کدام گزینه از اختلالات عاطفه است که با کاهش شدید در شدت احساسات ابراز شده مشخص می شود؟

۱. عاطفه محدود یا متراکم
۲. عاطفه کند
۳. عاطفه سطحی
۴. عاطفه بی ثبات

۱۹- کدام گزینه در زمینه توضیحات هیجانی درست بیان شده است؟

۱. هراس: اضطراب ناشی از خطری که واقعی و هشیارانه شناخته شده است.
۲. تهییج: حمله حاد، دوره ای و شدید اضطراب همراه با احساس شکننده ترس است.
۳. تخلیه هیجانی: حالت هیجانی کند همراه با گسستگی و بی تفاوتی است.
۴. تنش: افزایش فعالیت روانی و حرکتی که نامطبوع است.

۲۰- چرخش سر و اندام به طور مستمر در کدام دسته از کودکان بیمار دیده می شود؟

۱. اوتیستیک
۲. اسکیزوفرنی
۳. تشنج کلونیک
۴. دیستونی

۲۱- کدام گزینه از اختلالات حرف زدن به شمار نمی آید؟

۱. فشار تکلم
۲. استرئوگونوزیا
۳. آکولالیا
۴. برادی لالیا

۲۲- کدام ملاک (در رد سایر تشخیص ها و طرح تشخیص افتراقی) برای حذف تعیین سلسله مراتب همیشگی بین اختلالات به کار برده می شود؟

۱. منحصرأ در سیر..... روی نمی دهد.
۲. واجد ملاکهای لازم برای..... نیست.
۳. هرگز شامل ملاکهای لازم برای..... نبوده است.
۴. توضیح بهتری برای آن بیان نمی کند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپزشکی

سری سوال: ۱ یک

رشته تحصیلی/کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۷۱۰۹

۲۳- غرابت رفتار، فقدان اراده، کندی عاطفی و پسرقت اجتماعی از علائم کدام اختلال زیر است؟

۱. اختلال عصبی - شناختی خفیف
۲. اختلال افسردگی پس از پسیکوز اسکیزوفرنی
۳. اختلال تباه شدگی ساده
۴. اختلال پس از تکان مغزی

۲۴- پارکینسونیسم، آکینزی حاد و لرزش وضعیتی مربوط به کدام یک از اختلالات زیر است؟

۱. اختلال شخصیت افسرده
۲. اختلال حرکتی ناشی از دارو
۳. اختلال پر خوری دوره ای
۴. اختلال عصبی - شناختی خفیف

۲۵- معادل اختصاری الکتروانسفالوگرافی در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. DSM-IV-IR
۲. MRI
۳. CT
۴. EEG

۲۶- کدام گزینه از ویژگی های اساسی دلیریوم نیست؟

۱. تغییر هشیاری
۲. تغییر در توجه
۳. تخریب قلمرو کارکردی
۴. افزایش هیجانات

۲۷- ناقلین عصبی که بیش از همه در بیماری آلزهایمر نقش دارند، کدامند؟

۱. دوپامین - سروتونین
۲. استیل کولین - نوراپینفرین
۳. نوراپینفرین - دوپامین
۴. فقط سروتونین

۲۸- وجه تمایز اصلی در تشخیص دمانس و دلیریوم کدام گزینه است؟

۱. علل تغذیه ای در دمانس نقش مهم تری دارد.
۲. رفتارهای تکانشی در دلیریوم بیشتر است.
۳. شروع علائم دمانس تدریجی است ولی دلیریوم حاد است.
۴. آسیب لوب پس سری در دلیریوم مشخص است.

۲۹- کدام گزینه به اختلال خلقی ثانوی معروف است؟

۱. اختلال خلقی ناشی از یک اختلال طبی عمومی
۲. اختلالات ساختگی
۳. اختلالات تجزیه ای
۴. اختلالات پسیکوتیک

۳۰- اضطراب، افسردگی، توام با بی تابی، خستگی پذیری، ضعف و بی خوابی از علامتهای کدام اختلال غدد درون ریز است؟

۱. پرکاری تیروئید
۲. کم کاری تیروئید
۳. اختلال غدد فوق کلیوی
۴. اختلال پاراتیروئید